499

JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT

à

BRUXELLES (Belgique)

(SERRES FROIDES ET PLEINE TERRE)

LISTE

DES

PLANTES VIVANTES RUSTIQUES

OFFERTES PAR LE

Jardin Botanique de l'État à Bruxelles

ANNÉE 1904

GAND

IMPRIMERIE C. ANNOOT-BRAECKMAN

AD. HOSTE, SUCCESSEUR

1904

JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT

à

BRUXELLES (Belgique)

(SERRES FROIDES ET PLEINE TERRE)

LISTE

DES

PLANTES VIVANTES RUSTIQUES

OFFERTES PAR LE

Jardin Botanique de l'État à Bruxelles

ANNÉE 1904

GAND

IMPRIMERIE C. ANNOOT-BRAECKMAN

AD. HOSTE, SUCCESSEUR

1904

PLANTES VIVANTES RUSTIQUES

OFFERTES PAR

le Jardin Botanique de l'État à Bruxelles

Bryophyta (Muscineae).

Hepaticae.

Ancura pinguis, Dum.
Chomiocarpon quadratus, Lindl.
Corsinia marchantioides, Raddi.
Fossombronia angulosa, Raddi.
— caespitiformis, de Not.
Lunularia cruciata, Dum.
Oxymitra pyramidatum, Raddi.
Pellia epiphylla, Dum.
Plagiochasma elongatum, L. et G.
Preissia commutata, Nees.
Reboulia hemisphaerica, Raddi.
Riccia canaliculata, Hofm. et son accomodat aquatique R. fluitans, L.

Musci.

Camptothecium lutescens, Br. cur.
Fissidens adianthoides, Hedw.
Hypnum cupressiforme, L.
— rutabulum, L.
Leucobryum glaucum, Schimp.

Pteridophyta.

Polypodiaceae.

Cystopteris fragilis, Bernh.
Onoclea sensibilis, L.
Nephrodium Phegopteris, Baung.
Nephrodium Thelypteris, Desv.
— Dryopteris, Mich.
Aspidium angulosum, Willd.
Athyrium Filix-fœmina, Roth.
Scolopendrium vulgare, Sm.
Blechnum Penna-marina, Mitt.
Adiantum pedatum, L.
Pteridium aquilinum, L.
Polypodium vulgare, L.

Salviniaceae.

Azolla caroliniana, Willd.

Marsileaceae.

Marsilea quadrifolia, L.
— Drummondi, A. Br.

Equisetaceae.

Equisetum arvense, L.
— maximum, Lam.
— sylvaticum, L.
— palustre, L.
— limosum, L.
— hyemale, L.
— variegatum, Schlieh.

Selaginellaceae.

Selaginella helvetica, L.

Angiospermae.

Monocotyledoneae.

Typhaceae.

Typha latifolia, L.
— Schuttleworthii, Koch et Gond.
— stenophylla, Fisch et Mey.
— Laxmanni, Lepech.

Spargainaceae.

Sparganium simplex, Huds.
— ramosum, Curt.

Potamogetonaceae.

Potamogeton fluitans, Roth.
— crispus, L.
— pectinatus, L.
— pusillus, L.
— densus, L.

Aponohetonaceae.

Aponogeton distachyus, L. f.

Alismaceae.

Alisma Plantago, L.
— — v. lanceolata, With.
Caldesia parnassifolia, Ba.
Elisma natans, L. Buchenan.
Echinodorus ranunculoides, Engelm.
Sagittaria sagittifolia, L.

Butomaceae.

Butomus umbellatus, L.

Hydrochazitaceae.

Vallisneria spiralis, L.
Stratiotes aloides, L.
Hydrocharis Morsus-ranæ, L.

Gramineae.

Miscanthus sinensis, Anders.
Erianthis Ravennae, Beauv.
— Hostii, Gris.
Pennisetum fasciculatum, Tern.
— compressum, R. Br.
— latifolium, Spreng.
— macrourum, Trin.
Leersia oryzoides, Sw.
Phalaris arundinacea, L.
Stipa Calamagrostis, L.
— capillata, L.
Oryzopsis paradoxa, Nutt.
Muehlenbergia glomerata, Trin.
Phleum pratense, L.
— Boehmeri, Wibel.
Alopecurus pratensis, L.
Agrostis alba, L.
Calamagrostis Epigeios, Rth.
— arundinacea, Rth.
Ammophila arenaria, L.
Corynephorus canescens, Beauv.
Deschampsia caespitosa, Beauv.
— flexuosa, Trin.
Trisetum flavescens, Beauv.
— distichophyllum, Beauv.
Avena pubescens, Huds.
— pratensis, L.
Arrhenatherum elatius, M. K.
Cynodon Dactylon, L.
Spartinia stricta, Rth.
Beckmannia erucaeformis, Host.
Sesleria cœrulea, L.
Oreochloa disticha, Hoffm.
Arundo Donax, L.
Phragmites communis, Trin.
Molinia cœrulea, Moench.
Koeleria cristata, L.
Diarrhena americana, Beauv.
Uniola latifolia, L.
Briza media, L.
Dactylis glomerata, L.
Cynosurus cristatus, L.
Poa pratensis, L.
— nemoralis, L.

Glyceria aquatica, L.
Atropis distans, L.
Festuca ovina, L.
— heterophylla, LAM.
— pratensis, HUDS.
Nardus stricta, L.
Lolium perenne, L.
Agropyrum cristatum, J. CAERTN.
Hordeum europaeum, ALL.
Elymus arenarius, L.
Asperella Hystrix, HUMB.

Cyperaceae.

Eriophorum vaginatum, L.
— angustifolium, ROTH.
Scirpus fluitans, L.
— Savii, SEB et MAURI.
— Holoschœnus, L.
— pauciflorus, LIGHTF.
— lacustris, L.
— compressus, PERS.
Heleocharis palustris, L.
— ovata, RTH.
Schoenus nigricans, L.
Cladium Mariscus, L.
Carex Davalliana, SM.
— vulpina, L.
— muricata, L.
— paniculata, L.
— paradoxa, WILLD.
— brizoides, L.
— leporina, L.
— élongata, L.
— straminea, WILLD.
— remota, L.
— arenaria, L.
— disticha, HUDS.
— Goodenoughi, J. GAY.
— gracillima, SCHWEIN.
— praecox, JACQ.
— panicea, L.
Carex plantaginea, LAM.
— palescens, L.
— limosa, L.
— humilis, L.
— montana, L.
— tomentosa, L.
— depauperata, GOOD.
— extensa, GOOD.
— flava, L.
— punctata, GAUD.
— distans, L.
— hordeistichos, VILL.
— strigosa, HUDS.
— sylvatica, HUDS.
— laevigata, SM.
— pendula, HUDS.
— Pseudo-cyperus, L.
— vesicaria, L.
— riparia, CURT.
— paludosa, GOOD.
— ampullacea, GOOD.
— hirta, L.

Araceae.

Acorus Calamus, L.
— gramineus, AIT.
Calla palustris, L.
Hydrosme Rivieri, DUR.
Sauromatum guttatum, SCHOTT.
Pinella tuberifera, TEN.

Commelinaceae.

Tradescantia virginica, L.

Juncaceae.

Juncus squarrosus, L.
— arcticus, W.
— castaneus, SM.
Luzula pilosa, L.
— sylvatica, GAUD.
— campestris, DC.

Liliaceae.

Narthecium ossifragum, L.
Veratrum album, L.
Zygadenus elegans, PURSH.
Uvularia grandiflora, SM.
Tricyrtis hirta, HOOK.
Asphodelus albus, WILLD.
Asphodeline lutea, REICH.
Eremerus spectabilis, BUB.
Anthericum ramosum, L.
Hosta subcordata, SP.
— sieboldiana, HAST.
Hemerocallis flava, L.
Kniphofia aloides, MOENCH.
Gagea sylvatica, LOUD.
Allium vineale, L.
— schoenoprasum, L.
— ascalonium, L.
— Victorialis, L.
— senescens, L.
— oleraceum, L.
— ursinum, L.
— Moly, L.
Nothoscordum fragrans, KTH.
Brodiaea grandiflora, SMITS
— uniflora, BAKER.
— ixioides, WATS.
Erythronium Dens-canis, L.
Galtonia candicans, BAKER.
Dipcadi serotinum, M.
Scilla pratensis, W. et K.
— non-scripta, HOFFM. et LINK.
Camassia esculenta, LDL.
Ornithogalum nutans, L.
— narbonense, L.
— latifolium, L
Puschkinia scilloides, ADAMS.
Muscari moschatum, WILLD.
— racemosum, MILL.
— comosum, MILL.
Danaë racemosa, L.
Ruscus aculeatus, L.
Polygonatum officinale, ALL.
Convallaria majalis, L.
Liriope graminifolia, L.
Ophiopogon japonica, KER.
Smilax rotundifolia, L.

Amaryllidaceae.

Leucoium aestivum, L.
Amaryllis Belladona, L.
Sternbergia lutea, KER-GAWL.
Crinum longifolium, THUNB.
Narcissus Pseudo-narcissus, L.
— Jonquilla, L.
— Poeticus, L.
— Tazetta, L.
Alstrœmeria aurantiaca, SWEET.

Dioscoreaceae.

Dioscorea Batatas, DECNE.
Tamus communis, L.

Iridaceae.

Hermodactylis tuberosus, SALISB.
Iris stylosa, DESF.
— ensata, THUNB.
— graminea, L.
— sibirica, L.
— setosa, Pall.
— Pseudo-Acorus, L.
— — — var. acoroides.
— versicolor, L.
— virginica, L.
— foetidissima, L.
— laevigata, FISCH.
— Guldenstaedtiana, LEPECH.
— spuria, L.
— tectorum, MAXIM.
— chamaeiris, BERTOL.
— biflora, L.
— aphylla, L.
— flavescens, DC.

Iris sambucina, L.
— germanica, L.
— florentina, L.
— pallida, LAM.
— plicata.
Cypella Herberti, HERB.
Tigridia Pavonia, KER-GAWL.
Belamcanda chinensis, RED.
Sisyrinchium striatum, GM.
Tritonia crocosmiaeflora, HORT.
Sparaxis tricolor, KER-GAWL.
Gladiolus communis, L.
Freesia refracta, KLUTT.

Dicotyledoneae.

Salicaceae.

Salix retusa, L.
— purpurea, L.
— longifolia, MUHL.
— daphnoides, VILL.
— Lapponum, L.
— phylicifolia, L.
— Smithiana, WILLD.
— viminalis, L.
— fragilis, L.
— viminalis splendens, HORT.
— lanceolata, FRIES.
— vitellina, L.
— acuminata, SCHLEICH.
— alba nivea, HORT.
— lanceolata rugulosa, HORT.
— alba splendens, BRAY.
— pendulina, WEND.
— nigricans borealis, HORT.
— stipularis, SM.
— purpurea Lambertiana, ANDERRS
— cuspidata, SCHULTZ.

Urticaceae.

Boehmeria nivea, GAUDICH.
Parietaria diffusa, SCHUR.

Aristolochiaceae.

Asarum grandiflorum, KLOTSCH.
Aristolochia clematitis, L.

Polygonaceae.

Emex spinosa, CAMPH.
Rumex alpinus, L.
— scutatus, L.
— acetosa, L.
Oxyria reniformis, HOOK.
Polygonum Bistorta, L.
— sachalinense, F. SCHMIDT.

Chenopodiaceae.

Hablitzia tamnoides, BIEB.
Chenopodium Bonus-Henricus, L.

Basellaceae.

Boussingaultia baselloides, H. B et K.

Caryophyllaceae.

Stellaria Holostea, L.
— glauca, WITH.
Cerastium tomentosum, L.
Sagina glabra var. corsica.
Alsine graminifolia. J. F. GMEL.
— peploides, CRANTZ.
Arenaria serpyllifolia, L.
— graminifolia, SCHRAD.
Corrigiola littoralis, L.
Paronychia polygonifolia, DC.
Scleranthus perennis, L.
Viscaria vulgaris, RICHL.
— alpina, G. DON.
Silene Zawadzkii, HERBICH.
— Saxifraga, L.
— Armeria, L.
— Otites, SM.
— nutans, L.
Melandryum album, GARCKE.
Drypis spinosa, L.
Tunica Saxifraga, Scop.

Dianthus Armeria, L.
— Carthusianorum, L.
— arenarius, L.
— caesius, Sm.
— Caryophyllus, L.
Saponaria officinalis, L.

Ceratophyllaceae.

Ceratophyllum demersum, L.

Ranunculaceae.

Caltha palustris, L.
Trollius europaeus, L.
Eranthis hyemalis, Salisb.
Actaea spicata, L.
— cimicifuga, L.
Aquilegia vulgaris, L.
— chrysantha, A. Gray.
Delphinium consolida, L.
— cardiopetalum, DC.
— hybridum, Steph.
— Staphisagria, L.
Aconitum Lycoctonum, L.
— Napellus, L.
Anemone Pulsatilla, L.
— japonica, Sieb. et Zucc.
— narcissiflora, L.
— nemorosa, L.
— Hepatica, L.
Clematis tubulosa, Hook.
— Viticella, L.
— Flammula, L.
Ranunculus Ficaria, L.
— Flammula, L.
— aquatilis, L.
— fluitans, L.
— hederaceus, L.
Thalictrum minus, L.
Adonis vernalis, L.

Berberidaceae.

Podophyllum Emodi, Wall
Epimedium pinnatum, Fisch.

Papaveraceae.

Sanguinaria canadensis, L.
Chelidonium majus, L.
Macleya cordata, R. Br.
Glaucium luteum, Scop.
Dicentra spectabilis, L.
— formosa, Walp.
Corydalis glauca, Pursh.
— lutea, DC.

Cruciferae.

Lepidium Draba, L.
— campestre.
Biscutella laevigata, L.
— auriculata, L.
Iberis sempervirens, L.
Aethionema Buxbaumii, DC.
Cochlearia officinalis, L.
Isatis tinctoria, L.
Crambe maritima, L.
Nasturtium officinale, R. Br.
— Armoracia, Fries.
Draba aizoides, L.
Bunias orientalis, L.

Resedaceae.

Astrocarpus sesamoides, DC.
Reseda Luteola, L.
— lutea, L.
— alba, L.

Crassulaceae.

Sedum Rhodiola, DC.
— Anacampseros, L.
— Sieboldii, Sweet.
— Kamtschaticum, Fisch u. Mey.
— populifolium, Pall.
— album, L.
— acre, L.
— reflexum, L.
— glaucum, Waldst

Sempervivum tectorum, L.
— montanum, L.
— fimbriatum, SCHMITH.
— arachnoideum, L.
— Wulfeni, HOPPE
— globiferum, L.
— barbatulum, SCHOT.
Penthorum sedoides, L.

Saxifragaceae.

Astilbe rivularis, BUCH-HAM.
Bergenia crassifolia, FRITSCH.
— ligulata, ENGELM.
Boykinia aconitifolia, NUTH.
Saxifraga rotundifolia, L.
— geranioides, L.
— paniculata, CAV.
— hypnoides, L.
— decipiens, EHRH.
— moschata, SM.
— aizoon, JACQ.
— Cotyledon, L.
— sancta, GRISEB.
— oppositifolia, L.
Peltiphyllum peltatum, ENGLM.
Heuchera americana, L.
Tolmiea Menziesii, TORR et GRAY.
Tellima grandiflora, PUSCH.
Mitella pentandra, HOOK.

Rosaceae.

Potentilla sterilis, GKE.
— Anserina, L.
— sylvestris, NECK.
— palustris, SCOP.
— fruticosa L.
— recta, L.
— aurea, L.
Sibbaldia procumbens, L.
Waldsteinia geoides, WILLD.
Geum urbanum, L.
— rivale, L.
Geum montanum, L.
Alchemilla vulgaris, L.
— arvensis, SCOP.
Agrimonia Eupatoria, L.
Sanguisorba officinalis, L.
— minor, SCOP.
Acaena pinnatifida, BERT.

Leguminosae.

Thermopsis fabacea, DL.
Baptisia australis, R. BR.
Lupinus polyphyllus, LINDL.
Ononis spinosa, L.
— rotundifolia, L.
Trifolium montanum, L.
— fragiferum, L.
Anthyllis Vulneraria, L.
Galega officinalis, L.
Glycyrrhiza glabra, L.
Coronilla Emerus, L.
— scorpioides, KOCH.
Onobrychis sativa, LAM.
Lathyrus niger, BERNH.
Apios tuberosa, MOENCH.

Geraniaceae.

Geranium macrorrhizum, L.
— sanguineum, L.
— pyrenaicum L.

Oxalidaceae.

Oxalis Acetosella, L.

Linaceae.

Linum perenne, L.
— flavum, L.

Zygophyllaceae.

Pegamum Harmala, L.

Rutaceae.

Ruta graveolens, L.
Dictamnus Fraxinella, PERS.

Euphorbiaceae.

Mercurialis perennis, L.

Buxaceae.

Pachysandra procumbens, Michx

Empetraceae.

Empetrum nigrum, L.

Sapindaceae.

Koelreuteria paniculata, Laxm.

Vitaceae.

Vitis riparia, Michx.
Parthenocissus tricuspidata, Planch.
— quinquefolia, Planch.

Tamaricaceae.

Tamarix gallica, L.
— tetrandra, Poll.
Myricaria germanica, Desv.

Lythraceae.

Lythrum virgatum, L.

Onagraceae.

Chamaenerium angustifolium, Schur.
Kneiffia fruticosa, Rour.
Megapterium missouriense, Spach.
Circaea lutetiana, L.

Halorragitaceae.

Proserpinaca palustris, L.
Hippuris vulgaris, L

Araliaceae.

Hedera Helix, L.
Aralia racemosa, L.

Umbelliferae.

Hydrocotyle vulgaris, L.
Astrantia major, L.
Myrrhis odorata, Scop.
Molopospermum acutarium, DC.
Bupleurum longifolium, L.
Pimpinella Saxifraga, L.
Aegopodium Podagraria, L.
Crithmum maritimum, L.
Seseli gumiferum, Sm.
— nanum, Duf.
— montanum, Koch.
Fœniculum vulgare, Mill.
Meum athamanticum, Jacq.
Ligusticum pyrenaicum, Gouan.
— scoticum, L.
Angelica Archangelica, L.
Heracleum Sphondylium, L.

Pirolaceae.

Pirola minor, L.

Ericaceae.

Gaultheria procumbens, L.
— Shallon, Pursh.
Pernettya mucronata, Gaudich.
Arctostaphylos Uva ursi, Spr.

Primulaceae.

Primula cortusoides, L.
— acaulis, Jacq.
— denticulata, Sm.
— farinosa, L.
— japonica, Gray.
— auricula, L.
— viscosa, Vill.
Lysimachia Ephemerum, L.
— nummularia, L.
Steironema ciliata, Raf.
Naumburgia thyrsiflora, Moun.
Trientalis europaea, L.

Plumbaginaceae.

Plumbago europaea, L.
Ceratostigma Griffithii, Clarke.
Acantholimon glumaceum, Joub.
Goniolimon tartaricum, L.
Armeria vulgaris, Willd.

Gentianaceae.

Menyanthes trifoliata, L.
Villarsia parnassifolia, R. Br.
Limnanthemum nymphaeoides, Lh.

Apocynaceae.

Vinca minor, L.
Apocynum venustum, L.
— cannabinum, L.

Convolvulaceae.

Dichondra repens, F rst.
Calystegia Sepium, L.

Polemoniaceae.

Phlox paniculata, L.
— divaricata, L.
— subulata, L.
Polemonium cœruleum, L.

Hydrophyllaceae.

Hydrophyllum virginicum, L.

Boraginaceae.

Caccinia glauca, Savi.
Pulmonaria tuberosa, Schrank.
Mertensia sibirica, G. Don.
Lithospermum officinale, L.

Verbenaceae.

Verbena paniculata, Lank.
Lippia nodiflora, Rich.
Caryopteris Mastacanthus, Schau.

Labiatae.

Ajuga chamaeothis, L.
— reptans, L.
Teucrium montanum, L.
— chamaedrys, L.
— scordium, L.
— Scorodonia, L.
Scutellaria alpina, L.
— galericulata, L.
Scutellaria lateriflora, L.
Lavandula vera, DC.
Marubium vulgare, L.
— peregrinum, L.
Sideritis scordioides, Koch.
Agastache nepetoides, O. Kuntze.
Nepeta Kokamirrica, Regl.
— Cataria, L.
— tuberosa, L.
— grandiflora, Benth.
Glechoma hederacea, L.
Physostegia virginiana, Bent.
Melittis melissophyllum, L.
Eremostachys laciniata, Bunge
Phlomis Herba Venti, L.
— tuberosa, L.
Galeopsis pyrenaica, L.
Lamium Orvala, L.
— garganicum, L.
— album, L.
— galeobdolon, Crantz.
Ballota nigra, L.
Stachys alopecurus, Benth.
— officinalis, Trev.
— germanica, L.
— setifera, Mey.
— sylvatica, L.
Salvia officinalis, L.
— glutinosa, L.
— Verbenacea, L.
Monarda fistulosa, L.
— punctata, L.
Horminium pyrenaicum, L.
Melissa officinalis, L.
Satureia montana, L.
— rupestris, Wulf.
— calamintha, Schul.
— Clinopodium, Caruel.
— Acinos, Schul.
Hyssopus officinalis, L.
Origanum vulgare, L.

Koellia lanceolata, O. K.
Thymus Serpyllum, L.
— vulgaris, L.
Mentha viridis, L.
Plectranthus parviflorus, R. Br.

Solanaceae.

Solanum Dulcamara, L.
Cestrum Parquii, L'Herit.

Serophulariaceae.

Cymbalaria cymbalaria, Wettst.
Linaria alpina, Mell.
— Linaria, Wettst.
— genistifolia, Mell.
Scrophularia vernalis, L.
— aquatica, L.
Pentastemon procerus, Dougl.
— campanulatus.
Gratiola officinalis, L.
Veronica virginica, L.
— saxatilis, Scop.
— Beccabunga, L.
— Teucrium, L.
Wulfenia carinthiaca, Jacq.
Digitalis lanata, L.
— ambigua, Mur.
— lutea, L.

Acanthaceae.

Ruellia strepens, L.
Acanthus spinosus, L.

Plantaginaceae.

Plantago major, L.
— media, L.
— coronopus, L.
— lanceolata, L.
— maritima, L.
Litorella lacustris, L.

Rubiaceae.

Crucianella glauca, A. Rich.
Phuopsis stylosa, Gris.
Galium Cruciata, Scop.
— pariense, L.
Rubia tinctorium, L.

Caprifoliaceae.

Sambucus Ebulus, L.
— nigra, L.
— racemosa, L.

Valerianaceae.

Valeriana Phu, L.
— officinalis, L.
Centranthus ruber, DC.

Dipsacaceae.

Morinia longifolia, Wall.
Cephalaria alpina, Schrad.
Succisa pratensis, Moench.
Knautia arvensis, Coult.
Scabiosa columbaria, L.
— graminifolia, L.

Campanulaceae.

Campanula alliariaefolia, Willd.
— latifolia, L.
— glomerata, L.
— Rapunculus, L.
Adenophora liliifolia, L.
Phyteuma spicatum, L.
— canescens, W. K.
Hedraeanthus dalmaticus, A. DC.
Jasione perennis, Lam.
Platycodon grandiflorum, Jacq.
Lobelia syphilitica, L.
— Dortmana, L.

Compositae.

Vernonia noveborascensis, Willd.
Stokesia cyanea, L'Herit.
Eupatorium maculatum, L.
— cannabinum, L.
Solidago Virga-aurea, L.
— mexicana, L.

Solidago rigida, L.
Bellis perennis, L.
Boltonia latisquama, A. Gray
Aster corymbosus, Ait.
— alpinus, L.
— ovae Angliae, L
— acris, L.
— Linosyris, Bernh.
— Tripolium, L.
Antennaria dioica, Gaertn.
Leontopodium alpinum, Cass.
Anaphalis margaritacea, H. B.
Inula Helenium, L.
Buphthalmum speciosum, Schrad.
Helianthus strumosus, L.
Helenium autumnale, L.
Santolina chamaecyparissus
Anthemis nobilis, L.
— mixta, L.
Anacyclis Pyrethrum, DC.
Achillea Millefolium, L.
— Ptarmica, L.
Chrysanthemum Leucanthemum, L.
— macrophyllum, W. K.
— vulgare, Benth.
Artemisia Dracunculus, L.
Artemisia abrotanum, L.
— Absinthium, L.
Tussilago Farfara, L.
Petasites niveus, Munch.
Homogyne alpina, Cass.
Arnica montana, L.
Doronicum Pardalianches, L.
Ligularia macrophylla, DC.
Echinops horridus, Desf.
— sphaerocephalus, L
Cousinia Hystrix, C. A. Mey.
Carduus cernuus, Steud.
— crispus, L.
Cirsium syriacum, Grtn.
— canum, M. B.
Centaurea Rhaponticum, L.
— Lippi, Lu.
— alpina, L.
— babylonica, L.
— Jacea, L.
— Scabiosa, L.
Chondrilla juncea, L.
Taraxacum officinale, Weber.
Sonchus arvensis, L.
Hieracium umbellatum, L.

Plantes provenant des terrains expérimentaux.

Le Jardin botanique de Bruxelles établit, dans les diverses régions botaniques de la Belgique, des terrains expérimentaux qui servent, entre autres choses, à la culture, *dans leur milieu naturel*, des plantes les plus intéressantes de chaque région. — Dans la lis'e des espèces vivaces, dont nous offrons des exemplaires cette année, nous indiquons la station naturelle de chaque espèce : nous espérons faciliter ainsi leur culture dans les autres jardins botaniques.

A. Terrain de **NIEUPORT**, établi sur les *schorres* de l'estuaire de l'Yser.

(Les schorres sont des alluvions argileuses, inondées à marée haute.)

Triglochin maritima, L.
Glyceria maritima, Wahlberg.
Atriplex portulacoides, L. (Halimus Wallr.)
Spergularia salina, Presl.
Glaux maritima, L.
Armeria maritima, Willd.
Statice Limonium, L.
Plantago maritima, L.

B. Terrain de **COXYDE**, établi dans les dunes maritimes.

DS = Dunes hautes et sèches. | DB = Dunes basses et herbeuses.
PH = Pannes (fonds plats) humides.

PH Echinodorus ranunculoides, Rich. (Alisma L.) repens, Cav. s. sp.
DS Ammophilla arenaria, L.
DS Corynephorus canescens, L.
DS Koeleria cristata, L.
DS Festuca rubra, L. arenaria, Osbeck s. sp.
DS Agropyrum junceum, L.
DS Elymus arenarius, L.
PH Schoenus nigricans, L.
DS Carex areneria, L.
DB — trinervis, Desgland.
DS Asparagus officinalis, L.
PH Herminium Monorchis, R. Br.
DS Salix repens, L.
PH Sagina nodosa, L. moniliformis, Lange.
Alsine peploides, Crantz (Honckeneya Ehrh.). (Habite la plage même.)
DB Silene nutans, L.

DB Saponaria officinalis, L. fl. pl.
PH Ranunculus Flammula, L. caespititius, Dmrt. s. sp.
DS — bulbosus, L.
DS Thalictrum minus, L. dunense, Dmrt. s. sp.
DB Diplotaxis tenuifolia, L.
PH Parnassia palustris, L
DB Rubus caesius, L.
DB Potentilla sylvestris, Neck.
DB Rosa pimpinellifolia, L.
DS Ononis repens, L. prostrata, Bréb.
DB Trifolium fragiferum, L.
DS Anthyllis Vulneraria, L. maritima, Koch.
DB Lotus corniculatus, L. crassifolius.
PH Linum catharticum, L.
DS Euphorbia Paralias, L.
DB Helianthemum vulgare, Gaertn.
DB Viola canina, L. lancifolia, Dmrt.
DS — tricolor, L sabulosa, D. C. (Bor.)
DB Hippophaës rhamnoides, L.
PH Hydrocotyle vulgaris, L.
DS Eryngium maritimum, L.
PH Apium repens, Reichb. f.
PH Pirola rotundifolia, L. arenaria, Koch.
PH Primula officinalis, Jacq.
PH Samolus Valerandi, L.
PH Anagallis tenella, L.
DS Calystegia Soldanella, L.
DS Anchusa officinalis, L.
PH Myosotis palustris oraria Dmrt. s. sp.
DB Lithospermum officinale, L.
DB Solanum Dulcamara, L. (forme naine).
PH Veronica Anagallis, L.
DB Galium verum, L. littorale, Bréb
DB — Mollugo, L.
DB Senecio erucaefolius, L.
DB Cirsium acaule, All.
DS Hieracium umbellatum, L. (div. var.).

C. Terrain de **GROOTE KWINTE** établi dans les polders (alluvions argileuses endiguées) entre Furnes et Coxyde.

Typha angustifolia, L.
Sparganium ramosum, Curt.
Potamogeton crispus, L.
— pectinatus, L.
— pussillus, L.
— densus, L.
Alisma Plantago, L.
Sagittaria sagittifolia, L.
Butomus umbellatus, L.
Elodea canadensis, Rich.
Stratiotes aloides, L.
Hydrocharis Morsus-ranae, L.
Phalaris arundinacea, L.
Phragmites communis, Trem.
Glyceria aquatica, L.
— plicata, Fries.
Scirpus lacustris, L.
— maritimus, L.
Carex vulpina, L.
— Pseudo-cyperus, L.
— paludosa, Good.
Polygonum amphibium, L.
Rumex Hydrolapathum, Huds.
Ranunculus aquatilis, L.
— divaricatus, Schrank.
Lythrum Salicaria, L.
Apium nodiflorum, Reichb. f.
Sium erectum, Huds.
— latifolium, L.
Lysimachia vulgaris, L
Mentha aquatica, L.
Veronica Anagallis, L.

D. Terrain de **GENCK**, établi dans les bruyères et les marécages de la Campine.

Br S = Bruyères sèches.
Br H = Bruyères humides.
T = Tourbières.
E = Etangs et fossés.

T Nephrodium Thelypteris, Desv.
E Pilularia globulifera, L.
BrH Lycopodium inundatum, L.
E Isoetes echinospora, Durieu.
T Rhynchospora alba, Vahl.
T — fusca R. et S.
E Calla palustris, L.
T Narthecium ossifragum, Huds.
T Myrica Gale, L.
BrS Scleranthus perennis, L.
E Ranunculus Lingua, L.
E Subularia aquatica, L.
T Drosera rotundifolia, L.
T — intermedia, Hayne.
T Potentilla palustris, Scop. (Comarum, L.)
BrS Genista pilosa, L.
BrS Genista anglica, L.
T Hypericum Elodes, L.
T Viola palustris, L.
E Œnanthe fistulosa, L.
T Andromeda poliifolia, L.
T Vaccinium Oxycoccos, L.
BrH Erica Tetralix, L.
BrS Erica cinerea, L.
T Gentiana Pneumonanthe, L.
E Menyanthes trifoliata, L.
E Scutellaria minor, L.
E Veronica scutellata, L.
E Utricularia vulgaris, L.
E — minor, L.
E Littorella lacustris, L.
E Lobelia Dortmanna, L.

E. Terrain de **GROENENDAEL**, établi dans la forêt de Soignes (Futaie de hêtre.)

Nephrodium Filix-mas, Rich.
— Phegoteris, Prantl.
— montanum, Baker.
— spinulosum, Desv.
— Dryopteris, Michx.
Athyrium Filix-fœmina, Roth.
Blechnum Spicant, Sm.
Polypodium vulgare, L.
Equisetum maximum, Link.
Milium effusum, L.
Holcus lanatus, L.
Deschampsia cæspitosa, Trin.
— flexuosa, Nees.
Melica uniflora, Retz.
Dactylis glomerata, L.
Poa nemoralis, L.
Brachypodium sylvaticum, PB.
Carex remota, L.
— hirta, L.
Arum maculatum, L.
Juncus effusus, L.
Luzula sylvatica, Gaud.
Gagea spathacea, Salisb.
Allium ursinum, L.
Scilla non-scripta, Link.
Majanthemum bifolium, F. W. Schm.
Polygonatum multiflorum, All.
Paris quadrifolia, L.
Epipactis latifolia, All.
Listeraovata, L.

Urtica dioica, L.
Rumex crispus, L.
— Acetosella, L.
— Acetosa, L.
Stellaria Holostea, L.
— graminea, L.
Melandrium diurnum, Dmrt.
Saponaria officinalis, L.
Anemone nemorosa, L.
Ranunculus Ficaria, L.
Sedum purpurascens, Koch.
Chrysosplenium oppositifolium, L.
Fragaria vesca, L.
Potentilla sterilis, Gke.
— Anserina, L.
— sylvestris, Neck.
Geum urbanum, L.
Ulmaria palustris, Moench.
Agrimonia Eupatoria, L.
Lotus corniculatus, L.
Vicia sepium, L.
Lathyrus sylvestris, L.
Germanium Robertianum, L.
Oxalis Acetosella, L.
Euphorbia amygdaloides, L.
Hypericum pulchrum, L.
— hirsutum, L.
— perforatum, L.
— quadrangulum, L.
Viola sylvatica, Fries.
Chamænerium angustifolium, Schur.
Circaea lutetiana, L.
Sanicula europaea, L.
Pimprenella magna, L.
Aegopodium Podagraria, L.
Pyrola minor L.
Primula elatior, Jacq.
Lysimachia vulgaris, L.
— Nummularia, L.
— nemorum, L.
Vinca minor, L.
Ajuga reptans, L.
Teucrium Scorodonia, L.
Glechoma hederaceum, L.
Brunella vulgaris, L.
Stachys sylvatica, L.
Satureia Clinopodium, Carnel.
Lycopus europaeus L.
Linaria Linaria, Wettst.
Scrophularia nodosa, L.
Veronica officinalis, L.
— montana, L.
Digitalis purpurea, L.
Plantago major, L.
— lanceolata, L.
Galium Mollugo, L.
Adoxa Moschatellina, L.
Campanula Trachelium, L.
Phyteuma spicatum, L.
Eupatorium cannabinum, L.
Solidago Virgaurea, L.
Achillea Millefolium, L.
Chrysanthemum Leucanthemum. L.
— vulgare, Prantl.
Artemisia vulgaris, L.
Senecio Fuchsii, Gmel.
— nemorensis, L.
Picris hieracioides, L.
Hieracium pilosella, L.
— murorum, L.

F. Terrain de **SAMSON**, établi sur les rochers calcaires de la vallée de la Meuse.

R = Rochers | B = Bois | P = Pâturages secs.

R Nephrodium calcareum (Polypodium Sm).
B Scolopendrium vulgare, Symons.
P Avena pubescens, L.
R Sesleria caerulea, Ard.
R Melica ciliata, L.
R Poa compressa, L.
P Bromus asper, Murr.
B Arum maculatum, L.
R Anthericum Liliago, L. (Phalangium, Schreb).
R Allium sphaerocephalum, L.
B Polygonatum officinale, All.
R Silene venosa, Gilib. (S. inflata L.)
R — nutans, L.
B Helleborus foetidus, L.
B Aquilegia vulgaris, L.
B Anemone ranunculoides, L.
B Ranunculus auricomus, L.
B — nemorosus, L.
B Corydalis solida, Sm.
R Lepidium Draba, L.
B Lunaria rediviva, L.
P Saxifraga granulata, L.
P Potentilla verna, L.
P Sanguisorba minor, Scop. (Poterium, L.).
P Anthyllis Vulneraria, L.
R Hippocrepis comosa, L.
P Lathyrus (Orobus) tuberosus, L.
R Geranium lucidum, L.
B Mercurialis perennis, L.
R Helianthemum vulgare, Gaertn.
P Primula officinalis, Jacq.
B Cynanchum Vincetoxicum, Pers.
B Lamium maculatum, L.
B Atropa Belladona, L.
P Plantago media, L.
R Galium saxatile, L.
P Sambucus Ebulus, L.
P Knautia arvensis, Coult.
P Scabiosa Columbaria, L.
B Centaurea Scabiosa, L.
R Lactuca perennis, L.

G. Terrain de **FRANCORCHAMPS**, établi dans les hautes fagnes et les tourbières de l'Ardenne.

B = Bois
FS = Fagnes sèches.
FH = Fagnes humides.
T = Tourbières, et prairies très humides.
R = Rochers schisteux.

R Cystopteris fragilis, Bernh.
B Equisetum sylvaticum, L.
BS Lycopodium clavatum, L.
FS Nardus stricta, L.
T Eriophorum vaginatum, L.
FH Scirpus caespitosus, L.
FH Juncus squarrosus, L.
T — sylvaticus, Reich.
T Narthecium ossifragum, Huds.
B Polygonatum verticillatum, All.
T Polygonum Bistorta, L.
T Stellaria uliginosa, Murr.

T Drosera rotundifolia, L.
T Potentilla palustris, Scop. (Comarum, L.)
T Geum rivale, L.
B Alchemilla vulgaris, L.
FS — anglica, L.
T Lotus uliginosus, Schk.
T Epilobium palustre, L.
FH Meum athamanticum, Jacq.
T Andromeda poliifolia, L.
T Vaccinium Oxyoccos, L.
B — Myrtillus, L.
T Vaccinium uliginosum, L.
B — Vitis-idaea, L.
FH Erica Tetralix, L.
T Lysimachia vulgaris, L.
T Trientalis europaea, L.
FH Gentiana Pneumonanthe, L.
T Menyanthes trifoliata, L.
T Gratiola officinalis, L.
T Galium uliginosum, L.
FH Scabiosa Succisa, L.
T Wahlenbergia hederacea, Rchb.
T Arnica montana, L.

Bruxelles, le 10 novembre 1904.

Le Directeur,
Th. Durand.

Le Conservateur,
J. Massart.

Le Chef de Culture,
Cl. Marchandise.

Le Jardinier Chef,
F. Roekens.